

Bukscintigrafi (blödning)

Undersökningens tid: upp till 6 timmar, ev. ytterligare 30 min dagen efter

Syfte: Att påvisa eventuell blödning från mag-tarmkanalen.

Förberedelser: Inga särskilda förberedelser. Om du är gravid eller ammande var god kontakta oss omgående.

Utförande: Du kommer att få två intravenösa injektioner varav en med ett radioaktivt ämne, som gör det möjligt att påvisa eventuell blödning. Bildtagningen kommer att upprepas flera gånger under upp till 6 timmar första dagen. Ibland kan kompletterande bilder behövas dagen efter.

Strålskyddsinformation

Det radioaktiva läkemedel som du får i samband med denna undersökning ger, förutom en förhållandevis låg stråldos till dig själv, även en liten stråldos till personer i din omgivning. Detta gäller framförallt personer som vistas på nära håll. För att dosen till personer i din omgivning ska bli så låg som möjligt följer här några rekommendationer för hur du bör umgås med andra efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet.

- **Undvik nära kontakt (< 1 m)** med barn och gravida under **resten av dagen och natten**.
- Det radioaktiva läkemedel du fått utsöndras främst via njurar och urinblåsa. Under resten av dagen bör du därför **dricka extra** och **tömma blåsan ofta** och vara extra noga med **handhygienen** efter toalettbesök.
- Informera oss om du planerar att **resa utomlands** de **närmaste 4 dygnen** efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet, så får du ett intyg att visa upp för att underlätta vid gränskontroller.