

# Paratyreoideascintigrafi

---

**Undersökningens tid: ca 3 timmar**

**Syfte:** Lokalisation av paratyreoideavävnad (bisköldkörtelvävnad).

**Förberedelser:** Om du är gravid eller ammande var god kontakta oss omgående. V.g. meddela om du gjort någon röntgenundersökning med kontrast sista 3 månaderna.

**Utförande:** Du får en intravenös injektion med ett radioaktivt ämne. 15 minuter efter injektionen börjar vi fotografera över halsregionen. Bildtagningen kommer att upprepas flera gånger under c:a 2 ½ timmar. Därefter får du ytterligare en intravenös injektion och efter 15 minuter avslutar vi med en bild av sköldkörteln.

## **Strålskyddsinformation**

Det radioaktiva läkemedel som du får i samband med denna undersökning ger, förutom en förhållandevis låg stråldos till dig själv, även en liten stråldos till personer i din omgivning. Detta gäller framförallt personer som vistas på nära håll. För att dosen till personer i din omgivning ska bli så låg som möjligt följer här några rekommendationer för hur du bör umgås med andra efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet.

- **Undvik nära kontakt** (< 1 m) med barn och gravida under **resten av dagen och natten**.
- Det radioaktiva läkemedel du fått utsöndras främst via njurar och urinblåsa. Under resten av dagen bör du därför **dricka extra** och **tömma blåsan ofta** och vara extra noga med **handhygien** efter toalettbesök.
- Informera oss om du planerar att **resa utomlands** de **närmaste 4 dygnen** efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet, så får du ett intyg att visa upp för att underlätta vid gränskontroller.