

Amyloidoscintigrafi

Undersökningens tid: totalt ca 4 timmar

Syfte: Att påvisa eventuell inlagring av amyloid i hjärtmuskeln.

Förberedelser: Ring oss och **meddela din vikt** så snart som möjligt på telefon 0480-816 70 för att vi ska kunna förbereda rätt dos av undersökningspreparatet.

Om du är gravid eller ammande var god kontakta oss omgående.

Utförande: Du kommer till avdelningen och får en intravenös injektion med ett radioaktivt ämne. Efter ca 3h tas bilder av ämnets fördelning i kroppen med en gammakamera, bildtagningen tar ca 45 min. I pausen mellan injektionen och bildtagningen får du lämna avdelningen om du vill.

Strålskyddsinformation

Det radioaktiva läkemedel som du får i samband med denna undersökning ger, förutom en förhållandevis låg stråldos till dig själv, även en liten stråldos till personer i din omgivning. Detta gäller framförallt personer som vistas på nära håll. För att dosen till personer i din omgivning ska bli så låg som möjligt följer här några rekommendationer för hur du bör umgås med andra efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet.

- **Undvik nära kontakt** (< 1 m) med barn och gravida under **resten av dagen och natten**.
- Det radioaktiva läkemedel du fått utsöndras främst via njurar och urinblåsa. Under resten av dagen bör du därför **dricka extra** och **tömma blåsan ofta** och vara extra noga med **handhygiener** efter toalettbesök.
- Informera oss om du planerar att **resa utomlands** de **närmaste 4 dygnen** efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet, så får du ett intyg att visa upp för att underlätta vid gränskontroller.