

# Bentäthetsmätning

## Undersökningens tid: ca 30 minuter

**Syfte:** Att mäta mineralinnehållet i skelettet (bentäthet).

**Förberedelser:** Vänligen fyll i formuläret nedan och ta med det till undersökningen. Har du på grund av funktionshinder behov av extra hjälp, t.ex. med förflyttning till undersökningsbriks vill vi gärna att du hör av dig. Om du är gravid var god kontakta oss omgående.

**Utförande:** Du ligger på en undersökningsbriks och mineralinnehållet i skelettet (ländrygg och höft, ibland handled) mäts med en svag röntgenstråle.

### Frågeformulär inför bentätsmätning

Har du haft någon fraktur?	Ja	Nej
Har någon av dina föräldrar drabbats av höftfraktur?	Ja	Nej
Röker du?	Ja	Nej
Äter du kortison eller har någon gång ätit kortison mer än 3 månader?	Ja	Nej
Har du reumatoid artrit (ledgångsreumatism)?	Ja	Nej
Har du andra sjukdomstillstånd som kan orsaka benskörhet? * Insulinbehandlad diabetes? * Osteogenesis imperfecta (medfödd benskörhet)? * Menopaus före 45 års ålder? * Hypogonadism (låg produktion av könshormoner)? * Kronisk undernäring? * Kronisk leversjukdom? * Obehandlad långvarig hypertyreos (överfunktion av sköldkörteln)?	Ja	Nej
Dricker du mer än två glas vin (alt 2 glas öl el 60 ml sprit) om dagen?	Ja	Nej
Är du vänster- eller högerhänt?	Vä	Hö
Är du gravid? (gäller kvinnor 15-50 år)	Ja	Nej

Namnunderskrift: \_\_\_\_\_

Eventuella funderingar kring ovanstående frågor besvaras av undersökande personal